HALOPHYTEN

Ein Leben zwischen
Vergiftung und Verdursten

R. Albert, 9.11.2017

Salzpflanzen - Halophyten

- auffälliges Erscheinungsbild
- aber auch Massenvorkommen schöner Arten - Salzastern
- den Physiologen interessiert das Naturexperiment, wie Pflanzen mit dem Überschuss an lebensfeindlichen Salzen umgehen und sich daran angepasst haben
- landwirtschaftliche Probleme in ariden Ländern, Stichwort „Desertifikation“

Herkunft des Salzes ?

- * Salzablagerung der terziären Tethys
- * tektonische Störungen am Alpenostrand
- * artesische Brunnen z.B. Bartholomäusquelle
- * “salzführender Horizont“
- * pannonisches Klima
Salzausblühungen bei
hoher Evaporation

Verteilung von wasserlös. Salzen, pH-Wert und Leitfähigkeit (L) in:

- * Solonetz (oben)
- * Solontschak (unten)

Profiltiefe: 1 Meter

aus **Ghobadian** 1966
(Diss Univ. Bodenkultur)

Vielfalt an Salzlebensräumen und an Arten:

1) SOLONTSCHAK-Gebiet – westlich: Illmitzer Zicksee
„Hölle“, Oberstinkersee

* *Salzlacken (Sodalacken)*

* *„Blindzickstellen“ - Solontschak*

2) SOLONETZ-Gebiet ----- östlich: Lange Lacke
Wörthenlacken

* *Salzlacken (Sodalacken)*

* *Wermut-Salzsteppen*

* *Abzugsrinnen; „Blindzickstellen“*

3) *Feuchtwiesen meist im Anschluss von Salzlacken bzw.
Reste ehemaliger Salzlacken ?*

Sodalacken

(Solantschak)

Suaeda pannonica – Ungarische Salzmelde

Suaeda pannonica – Ungarische od. Große Salzmelde

Puccinellia peisonis – Neusiedlersee-Salzschwaden

Tripolium pannonicum ssp. *pannonicum* - Salzaster

Atriplex prostrata – Spieß-Melde

Chenopodium chenopodioides – Dickblatt-Gänsefuß

Chenopodium glaucum - Graugrün-Gänsefuß

Schoenoplectus tabernaemontani - Salzteichbinse

Bolboschoenus maritimus – Strand-Knollenbinse

Crypsis aculeata - Dorngras

„Blindzick“-Flächen

(Solontschak)

Lepidium cartilagineum - Salzkresse

Blindzickstelle mit Salzkresse und Salzschwaden

Die Salzkresse als Sandfilter

Salicornia prostrata – Pannonien-Glasschmalz, Queller

der Queller in herbstlicher Färbung durch Betalaine

Salicornia prostrata – Pannonien-Glasschmalz, Queller

Salicornia prostrata – Pannonien-Glasschmalz, Queller

Spergularia maritima - Flügel-Schuppenmire, Salzmiere, Strand-Schuppenmire

Centaurium littorale – Salz-Tausendguldenkraut

Plantago maritima – Meerstrand-Wegerich

Verteilung von wasserlös. Salzen, pH-Wert und Leitfähigkeit (L) in:

- * Solonetz (oben)
- * Solontschak (unten)

Profiltiefe: 1 Meter

Aus **Ghobadian** 1966
(Diss Univ. Bodenkultur)

Sodalacken

(Solonetz)

Cyperus fuscus – Braun-Zypergras

Crypsis schoenoides – Knopfbinsen-Sumpfgras

Cyperus pannonicus – Pannonien -Zypergras

Crypsis aculeata - Dorngras

Rumex palustris – Sumpf-Ampfer

Rumex maritimus – Strand- Ampfer, goldgelber A.

Ranunculus rionii – Zart-Wasserhahnenfuß

Lotus tenuis – Sumpf-Ampfer

Samolus valerandi – Salz-Bunge

Wermut-Salzsteppen

(Solonetz)

Artemisia santonicum – Salzsteppen-Wermut

Peucedanum officinale – Sumpf-Haarstrang

Galatella linosyris (=Aster linosyris) – Goldschopf-Steppenaster

Galatella punctata (=Aster canus) – Grau-Steppenaster (lila)

Blindzickstellen, Abzugsrinnen (Solonetz)

Camphorosma annua – Einjahrs-Kampferkraut

Pholiurus pannonicus – Schuppenschwanz, pannon. Dünnschwanz & *Plantago tenuiflora* – Dünnähren-Wegerich

Plantago tenuiflora – Dünnähren-Wegerich

Matricaria chamomilla ssp., var. (?) *bayeri*

Myosurus minimus (Ranunc.) – Mouseschwänzchen

(Salz)wiesen,
(Salz)weiden
(Solonetz)

Trifolium fragiferum – Erdbeerklee

Taraxacum bessarabicum – Salz-Löwenzahn

Bupleurum tenuissimum – Salz-Hasenohr

Bupleurum tenuissimum – Salz-Hasenohr

(Salz)feuchtwiesen

Cirsium brachycephalum – Kurzkopf-Kratzdistel

Salzaster-Bestand mit *Agrostis stolonifera* (Kriech-Straußgras)

Lotus maritimus (= *Tetragonolobus siliquosus*) – Gelb-Spargelklee

Achillea asplenifolia – Salz-Schafgarbe

Iris spuria – Salzwiesen-Schwertlilie

Scorzonera parviflora – Salz-Schwarzwurz
Juncus gerardii – Salz-Simse

Triglochin maritimum – Meerstrands-Dreizack
Anacamptis palustris – Sumpf-Hundswurz

Herkunft der Arten ...?

Unterschiedlich weit kontinental verbreitete Sippen!

Mit gelegentlich disjunkten
Vorkommen in Mittel-, West- und
(oft) Südost-Europa

Achillea asplenifolia
Artemisia santonicum
Camphorosma annua
Carex hordeistichos
Carex secalina
Cerastium dubium
Chenopodium chenopodioides
Cirsium brachycephalum
Crypsis schoenoides
Cyperus pannonicus
Galatella punctata (Aster canus)
Lepidium cartilagineum
Peucedanum officinalis
Pholiurus pannonicus
Plantago tenuiflora
Scorzonera parviflora
Taraxacum bessarabicum
(*Inula britannica*)
(*Festuca pseudovina*)

Arten, die bevorzugt an Küsten – tw. auch Binnenland - (S- und/oder N-)Europas leben und tw. (weit) nach Osten (Eurasische Sippen) bzw. ins Südmediterranean und in mauretanische Steppengebiete ausstrahlen;
auf anderen Kontinenten tw. eingeschleppt (z.B. *Atriplex prostrata*) oder dort natürlich (*Juncus gerardii* in Amerika?)

- Atriplex prostrata*
- Bupleurum tenuissimum*
- Centaurium littorale*
- Centaurium pulchellum*
- Chenopodium glaucum*
- Iris spuria*
- Juncus gerardii* *)
- Lotus maritimus*
- Lotus tenuis*
- Odontites vulgaris*
- Plantago maritima* *)
- Rumex maritimus*
- Rumex palustris*
- Spergularia maritima*
- Spergularia salina*
- Trifolium fragiferum*
- Triglochin maritimum*

*) kosmopolitisch?

(*Glaux maritima* [Zwingendorf]
Europa, Nordasien, N-Amerika)

Bupleurum tenuissimum

Kosmopolitische Verbreitung:
 z.T. anthropogen gefördert
 („Neophyten“ in Übersee)

- Agrostis stolonifera*
- Bolboschoenus maritimus*
- Juncus maritimus*
- Myosurus minimus*
- Samolus valerandi*
- Schoenoplectus pungens*
- Schoenoplectus*
tabernaemontani

Und jetzt kommen wir zum Thema!

Vergiftung oder Verdursten?

**Denken Sie an gesalzene,
angeschnittene Radieschen.....!**

Abb. 3.7. Ionenkonzentration und lösliche Kohlenhydrate im Zellsaft von Halophyten des Neusiedlerseegebietes (Österreich). FW = Frischwasser, OA = organische Anionen, Oxalat ist durch kräftige Umrandung hervorgehoben. 1 = Chenopodiaceae, 2 = Caryophyllaceae, 3 = Brassicaceae, 4 = Plantaginaceae, 5 = Asteraceae, 6 = Juncaginaceae, 7 = Juncaceae, 8 = Cyperaceae, 9 = Poaceae (nach ALBERT und POPP 1977, 1978).

- (1) Osmotische Anpassung („osmotic adjustment“) als notwendige Voraussetzung für eine ungestörte Wasseraufnahme aus dem osmotisch belasteten Salzboden
- (2) bei **dikotylen Arten** spielen anorganische Ionen, insbes. die im Boden vorhandenen Salzionen eine sehr wichtige Rolle; manchmal auch organische Säuren (Oxalat, Malat, Zitrat). Zucker sind von geringer Bedeutung – Ausnahme Artemisia
- (3) die Qualität der gespeicherten Ionen ist sehr unterschiedlich:
 - bzgl. *Anionen*
 - * Chlorid-Halophyten
 - * Sulfat-Halophyten
 - * „Alkali-Halophyten“ (nach Heinrich Walter)
 - hoher Gehalt an organischen Säuren, v.a. Oxalat
 - bzgl. *Kationen*
 - Chenopodiaceen sind Natrium-Speicherer („Sodiophilie“)
- (4) **monokotyle Arten**: Gräser (Poaceae), Sauergräser (Cyperaceae) und Binsen (Juncaceae) sind mehr/minder salzausschließende Halophyten („salt excluders“), zeigen aber eine Vorliebe für Kalium („Potassiophilie“)

die daraus resultierende mangelhafte osmotische Anpassung wird durch Speicherung von Zuckern (Glucose, Fructose, Saccharose) ausgeglichen.

Abb. 3.7. Ionenkonzentration und lösliche Kohlenhydrate im Zellsaft von Halophyten des Neusiedlerseegebietes (Österreich). FW = Frischwasser, OA = organische Anionen, Oxalat ist durch kräftige Umrandung hervorgehoben. 1 = Chenopodiaceae, 2 = Caryophyllaceae, 3 = Brassicaceae, 4 = Plantaginaceae, 5 = Asteraceae, 6 = Juncaginaceae, 7 = Juncaceae, 8 = Cyperaceae, 9 = Poaceae (nach ALBERT und POPP 1977, 1978).

Abb. 3.13. Ionenkonzentration und lösliche Kohlenhydrate im Zellsaft von Xerohalophyten aus Salzsteppen und -wüsten in Utah (USA). Oxalat ist durch kräftige Umrandung hervorgehoben. Proben von 8 Standorten; Bodensalzgehalt: $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$; die vorletzte Pflanzengruppe mit *Atriplex corrugata* stammt von einem Gipsboden bei Price/Utah, *Atriplex hymenelytra* aus dem „Death Valley“. 1 = Chenopodiaceae, 2 = Poaceae (Original).

Puccinellia peisonis-dominierte Salzwiesen als besonders energiereiche und wenig salzbelastete Gänseweiden....?

Puccinellia peisonis
Salzschwaden

Suaeda pannonica
Salzmelde

Typische Zelle im Blattgewebe mit Cytoplasma („cytoplasmatischer Wandbelag“) und großer zentraler Vakuole
höhere NaCl-Konzentrationen sind für alle Makromoleküle, insbesondere Enzyme (Proteine-Eiweißstoffe) im
Cytoplasma toxisch: Störung des Hydratationsmantels der Proteine, dadurch Veränderung ihrer Struktur und Funktion
schon bei rel. niedrigen Salzkonzentrationen

Kalium ist dagegen ein „Aktivator“ vieler Stoffwechselprozesse

„Salzkompartimentierung“ innerhalb der Zelle ist **DIE zentrale Salztoleranz- bzw. Salzregulations-Strategie!!**

- * Überwiegende Speicherung der Salzionen in der „leblosen“ Vakuole, von Kalium dagegen im Cytoplasma (--- Ionenpumpen!);
- * Akkumulation von stoffwechselverträglichen Verbindungen („cytoplasmatische Oskotika“, „kompatible Verbindungen“, engl. „compatible solutes“)

Kompatible Substanzen im Cytoplasma von Halophyten bei der NaCl-Akkumulation

Prolin und Beatine:

Prolin

Prolinbetain

Glycinebetain

beta-Alaninebetain

Zuckeralkohole:

Glycerol

D-Sorbitol

D-Dulcitol

D-Mannitol

Sonderfall!
Sulfoniumderivate:

Pinitol

D-Quercitol

Floridosid

Digeneasid

D-1-O-Methylmucoinositol

"Compatible solutes" in halophytes

Unsere Seewinkel Extrem-Halophyten zeigen folgendes Verteilungsmuster an „cytoplasmatischen Osmotika“:

- * Prolin: *Triglochin maritimum*, *Lepidium cartilagineum*
- * Glycinbetain: alle Chenopodiceen (*Suaeda*, *Salicornia*, *Chenopodium* sp., *Atriplex prostrata*, *Camphorosma annua*)
- * Cyclite (Pinitol): *Lotus maritimus*, *Lotus tenuis*, *Spergularia* sp.
- * Hexitol (Dulcitol): *Plantago maritima*

Manche Arten verwenden Osmotika aus zwei oder drei dieser Substanzklassen:

Betain, Prolin und/oder Cyclite:
Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae und Asteraceae (*Tripolium pannonicum*)

"Compatible solutes" in halophytes

"compatible solutes" in xerophytes

Bereits Schimper erkannte 1898 die
Analogie zwischen Halophyten und
Xerophyten!

„Physiologische“

versus

„Physikalische“

Trockenheit

Strategien zur Salzregulation auf Ebene der Gesamtpflanze

* Sukkulenz

Salzkresse

- *Lepidium cartilagineum*

Salzsukkulenz:

- * Streckung der Mesophyllzellen mit zunehmendem Alter
- * hormonell (ABA ?) gesteuerte Neusynthese von Zellwandmaterial
- * Erhöhung des absoluten Wassergehaltes der Zellen
---- Verdünnung!
- * Salzkonzentration bleibt konstant bzw. steigt mit dem Blatalt nur langsam an - Verzögerung einer (unvermeidlichen!) Übersalzung durch den Transpirationsstrom
- * Verlängerung der Lebensdauer = Energieeinsparung!

junges Blatt

altes Blatt

Abb. 3.38. Chloridgehalt der Blätter von *Laguncularia racemosa* mit steigendem Sukkulenzgrad. × = in mmol/dm² Blattfläche, ○ = in mmol/g Sättigungswasser (aus BIEBL und KINZEL 1965).

Abb. 3.39. *Laguncularia racemosa*, Blattquerschnitte. Mit dem Alter nimmt die Sukkulenz stark zu (aus BIEBL und KINZEL 1965).

Kinzel H. (Hrsg.) (1982): Pflanzenökologie und Mineralstoffwechsel, Ulmer Verlag Stuttgart.

besonders deutlich ist Salzsukkulenz bei der Salzmelde ausgeprägt; im mikroskopischen Querschnitt Des Blattes sieht man die lang gestreckten, wasserreichen Mesophyllzellen

und beim Meerstrandswegerich
(*Plantago maritima*)

Ein Vergleich mit dem nicht halophilen
Spitzwegerich lässt die deutlich ge-
streckten und wasserreichen Meso-
phyllzellen erkennen.

Spitzwegerich

Strategien zur Salzregulation auf Ebene des Blattes bzw. Gesamtpflanze

- * Sukkulenz – Verdünnung durch Wasseraufnahme
- * **Verdünnung durch Wachstum:**
 - interkalares Wachstum bei Monokotylen:
basale Sprossabschnitte bleiben wachstums- und
teilungsfähig (meristematisch)
 - Erneuerungstriebe

Strategien zur Salzregulation auf Ebene des Blattes bzw. Gesamtpflanze

- * Sukkulenz – Verdünnung durch Wasseraufnahme
- * Verdünnung durch Wachstum:
 - interkalares Wachstum bei Monokotylen:
basale Sprossabschnitte bleiben wachstums- und
teilungsfähig (meristematisch)
 - Erneuerungstriebe
- * Rosetten- und Halbrosettenpflanzen

„Rosettenpflanzen“ erneuern kontinuierlich ihre übersalzten Blätter

Triglochin maritimum – Meerstrands-Dreizack

Strategien zur Salzregulation auf Ebene des Blattes bzw. Gesamtpflanze

- * Sukkulenz – Verdünnung durch Wasseraufnahme
- * Verdünnung durch Wachstum:
 - interkalares Wachstum bei Monokotylen:
basale Sprossabschnitte bleiben wachstums- und teilungsfähig (meristematisch)
 - Erneuerungstriebe innerhalb des Horstes
- * Rosetten- und Halbrosettenpflanzen
- * **Ökonomischer Wasserhaushalt**
 - **Xeromorphie**
 - **C4 – Pflanzen**

Blattquerschnitt von *Puccinellia peisonis* – Salzschwaden
keine Sukkulenz!

Anatomische Ähnlichkeit mit trockenoleranten Steppengräsern

Xeromorphie mit Minimierung des Wasserumsatzes (= Minimierung der passiven Salzeinschwemmung)

Carex distans mit innerem Wassergewebe und Sklerenchym –
Kombination von Sukkulenz & Xeromorphie ?

Tripolium pannonicum

Plantago maritima

Dicke Cuticula zur Unterdrückung der cuticulären Transpiration

Dorngras und Kampferkraut sind diejenigen beiden Halophyten, die ihre Photosynthese über die wassersparende Variante des „C-4 Metabolismus betreiben

Strategien zur Salzregulation auf Ebene des Blattes bzw. Gesamtpflanze

- * Sukkulenz – Verdünnung durch Wasseraufnahme
- * Verdünnung durch Wachstum:
 - interkalares Wachstum bei Monokotylen:
basale Sprossabschnitte bleiben wachstums- und
teilungsfähig (meristematisch)
 - Erneuerungstriebe innerhalb des Horstes
- * Rosetten- und Halbrosettenpflanzen
- * Ökonomischer Wasserhaushalt
 - Xeromorphie
 - C4 – Pflanzen
- * **Blasenhaare**

Die Blasenhaare des Graugrünen Gänsefußes dienen als „Salzdrüsen“

Blasenhaare von
Chenopodium glaucum

Die Stielzelle wirkt wie eine Drüsenzelle, die auf dem Weg über das Endoplasmareticulum Salzionen aus den Mesophyllzellen in die Blaszelle („bladder cell“) pumpt

Strategien zur Salzregulation auf Ebene des Blattes bzw. Gesamtpflanze

- * Sukkulenz – Verdünnung durch Wasseraufnahme
- * Verdünnung durch Wachstum:
 - interkalares Wachstum bei Monokotylen:
basale Sprossabschnitte bleiben wachstums- und teilungsfähig (meristematisch)
 - Erneuerungstriebe innerhalb des Horstes
- * Rosetten- und Halbrosettenpflanzen
- * Ökonomischer Wasserhaushalt
 - Xeromorphie
 - C4 – Pflanzen
- * Blasenhaare
- * **Salzdrüsen**

Glaubersalzböden (Na_2SO_4)

Zwingendorf/Pulkautal

Glaux maritima (Myrsinaceae s.l.,
früher Primulaceae)

einzigste Halophytenart in Österreich
Mit „echten“ Salzdrüsen!

Einige Bemerkungen zur Frage
obligater und **fakultativer** Halophyten

und zur Frage der **Konkurrenz**....

Puccinellia peisonis
Salzschwaden

Suaeda pannonica
Salzmelde

Lepidium cartilagineum
Salzkresse

(1) obligate Halophyten

Lepidium, Salicornia, Suaeda
Camphorosma ? Spergularia ?

(2) fakultative Halophyten

überwiegende Mehrzahl !!

(3) salzindifferente Arten

z.B.: Rumex limosus & maritimus
Lotus maritimus
Trifolium fragiferum
Ranunculus sp.
Myosurus minimus
Odontites vulgaris
Mentha pulegium
Sonchus ssp.
Inula britannica
Pulicaria vulgaris, P. dysenterica

Cyperus fuscus
Schoenoplectus sp.
Orchis (=Anacamptis) palustris
..... (siehe in M.A.Fischer:
„salzertragend...“ o.ä.!)

**Risikofaktoren für unsere
Salzvegetation im Seewinkel ??**

Gebietsentwässerung verbunden mit Grundwasserabsenkung ist der größte, übergeordnete Risikofaktor ...

Dies würde langfristig zur Ausschwemmung der Salze aus dem Oberboden und damit zur „Aussüßung“ des ganzen Gebietes führen!

Seewinkel

Legende
Apetlon

Entwässerungskanal

Apetlon

Google Earth

3 km

Lacken im Seewinkel

Umfeld
 und Salzstep-
 hochgradig ge-
 igenart, Selten-
 u vorrangigen
 schutzes erklärt
 ee - Seewinkel
 d schönsten Bei-

**Wasserstands-
 hwemmung**
 Lacken von 139 im
 gegangen. 2013
 igermaßen
 en von Lacken
 g von Entwäs-
 len Grundwas-
 n vom lebens-
 Untergrund ab-
 Salz aus dem

Rettung durch Rückstau von Entwässerungsgräben

Durch den Rückstau von Gräben kann der Salznachschub wieder in Gang gebracht und die Ableitung von Salz aus den Lacken verringert werden. 2015 wurden solche Rückstaumaßnahmen zur Rettung der Langen Lacke durchgeführt. Das Projekt wurde vom WWF Österreich angeregt und mit Unterstützung von Coca-Cola durch den Burgenländischen Wasserbau, die Wassergenossenschaft Apetion, die Gemeinde Apetlon und den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel umgesetzt.

„Lackensterben“
 1855–1986

Quelle: Dvorak, Grill, Kohler, Rauer:
 Vogelparadies mit Zukunft? Ramsar
 Gebiet Neusiedler See - Seewinkel

Strukturverlust bei zu häufigem
Austrocknen der Lackenböden

(Wörthenlacken!)

Eutrophierung:

nitrophile Arten nehmen mancherorts stark zu:

Chenopodium chenopodioides

Ch. glaucum

Rumex-Arten

Xanthium sp

Solanum nigrum ?

Ist Beweidung ein Risiko ??

Achillea asplenifolia

Agrostis stolonifera

Artemisia santonicum

Galatella punctata (Aster canus)

Atriplex littoralis +

Atriplex prostrata

Bolboschoenus maritimus

Bupleurum tenuissimum

Camphorosma annua

Carex distans

Carex hordeistichos

Carex secalina

Centaurium littorale **regional gefährdet**

Centaurium pulchellum **regional gefährdet**

Cerastium dubium

Chenopodium chenopodioides

Chenopodium glaucum: **regional gefährdet**

Cirsium brachycephalum

Crypsis aculeata

Crypsis schoenoides +

Festuca pseudovina **potentiell gefährdet**

Inula britannica

Iris spuria

Juncus gerardii

Juncus maritimus

Lepidium cartilagineum

Linum maritimum +

Lotus maritimus

Lotus tenuis

Myosurus minimus

Odontites vulgaris

Peucedanum officinalis

Pholiurus pannonicus +

Plantago maritima

Plantago tenuiflora +

Puccinellia limosa

Puccinellia peisonis

Pulicaria vulgaris +

Rumex maritimus

Rumex palustis

Salicornia prostrata

Samolus valerandi

Schoenoplectus pungens: +

Schoenoplectus tabernaemontanus

Scorzonera parviflora

Spergularia maritima

Suaeda pannonica

Suaeda prostrata

Taraxacum bessarabicum

Trifolium fragiferum

Triglochin maritimum

Tripolium pannonicum ssp. pannonium

Xanthium strumarium

**87% Rote-
Liste-Arten!**

leicht salzhaltige Wiesen sind Refugium für sehr seltene Arten!

Steif-Klee – *Trifolium retusum*

Streifen-Klee - *Trifolium striatum*

Mauer-Gipskraut - *Gypsophila muralis*

Offene taxonomische Fragen:

Standortsmodifikation durch
Stressfaktoren od. subsp. ??
Arten- und subsp.-Abgrenzungen?

z.B.:

Sonchus

Xanthium

Plantago

v.a. Puccinellia

???

Stress-Standorte als Motor der
Evolution

Danke für Ihre Aufmerksamkeit
und Geduld!